

UTILISATION DES GROUPES DE CONDUITE

Note à destination des
conseillers, techniciens
et agents de pesées
bovins croissance

03 AVRIL 2020

France Conseil Elevage

Créé par le groupe des Relais Qualité CPV

Utilisation actuelle des GC dans le réseau

40%	• des cheptels suivis en VA4 ont une collecte des groupes de conduite
25 à 50%	• variation par race de la collecte des groupes de conduite
0 à 80%	• variation par OBC de la collecte des groupes de conduite
+ de 10 OBC	• n'effectuent aucune collecte de groupe de conduite

Dans quelles situations faut-il utiliser les GC ?

La création d'un groupe de conduite doit-être envisagée dès qu'il y a un écart de conduite entre deux lots, par exemple :



Une différence de complémentation entre les lots de veaux



La mise en place d'un système économe pour un lot d'animaux



Une quantité et/ou qualité d'herbe différente fournie



Des dates de mise à l'herbe ou entrée en stabulation différentes




Une mise à l'engraissement d'une partie des mères ...

Pour rappel, un groupe peut être constitué à partir de 2 animaux du même sexe.

Repères pour m'alerter sur l'intérêt de créer des GC



S'il y a des tris d'animaux en lots



Si écart de croissance > 80g/j entre deux lots du même sexe



Incidence des Groupes de Conduite sur les résultats

80 Kg

Les différences de conduite à l'intérieur d'un élevage (présence de groupe de conduite) expliquent des écarts de poids à 210 jour pouvant aller jusqu'à 80Kg entre groupe d'animaux du même sexe.


C'est un critère 3 fois plus impactant que l'effet sexe et 5 fois plus impactant que la saison de naissance

80kg c'est l'équivalent des différences moyennes observées entre élevages !

L'absence de groupe de conduite engendre des erreurs d'indexation importantes.


Par exemple, si des animaux sont complémentés et d'autres non, cela :

- Détérioré les index des animaux qui non pas été complémentés,
- Améliore arbitrairement les index des animaux complémentés,
- Engendre des variabilités d'une année sur l'autre des index des vaches en fonction des attributions des animaux à un lot complémenté ou pas,
- Défavorise à tort des index de vaches qui n'ont que des femelles ou des mâles broutards (non préparés en repro) dans les cheptels vendeurs de reproducteurs,
- Engendre une indexation biaisée et surestimée des taureaux qui auraient une proportion plus importante de mâles broutards.



Impact de la non-réalisation des GC pour l'éleveur

La non-réalisation de groupe de conduite diminue le niveau de discrimination des potentiels du cheptels et :



En d'autres termes, la non-réalisation des groupes de conduite engendre une perte réelle de fiabilité de données, qui conduit l'éleveur à prendre des décisions non appropriées dans la conduite de son élevage.

Réponses aux objections clients

Objection : Cela ne m'apporte rien, je ne regarde pas les index :

Réponse : Les GC par lots d'animaux permet d'avoir une vraie expertise des leviers techniques pour améliorer la conduite de chaque lot

Objection : Je ne veux pas faire de GC, car cela va dégrader les index de mes mères à reproducteurs

Réponse 1 : Les vaches n'ont pas chaque année un mâle. Cela va engendrer de la variabilité dans les index d'une année sur l'autre.

Réponse 2 : Si vente de reproducteur, il y aura une correction des index des mères car l'indexation des collatéraux apporte un volume d'information important. Cela engendre très vite une perte de crédibilité pour les ventes futures.

Objection : Que mes veaux naissent en novembre, ou en mars, et ils sont tous conduits pareil.

Réponse : Les veaux vont avoir des PAT calculés sur des périodes différentes, donc avec des systèmes d'alimentation différents. Un veau élevé en bâtiment ou en plein air n'est pas comparable. L'écart de croissance moyen entre la situation favorable (automne-hiver) et la situation plus défavorable de printemps est d'environ 80 g/j, si l'on observe des écarts supérieurs ou inférieurs, la création de groupes de conduite spécifiques se justifie.

Objection : Mes deux lots de mâles sont conduits de la même façon. Ils sont au pré avec nourrisseur.

Réponse : On observe des différences significatives de croissance. Les parcelles sont-elles de même qualité ? La valeur nutritionnelle des parcelles est un élément important à prendre en compte.

Objection : Mon voisin ne fait pas de groupe de conduite, cela va dégrader mes animaux

Réponse : Les choix de votre voisin n'ont pas de liens directs avec les vôtres. Cependant, si vous en faites vous aurez une hiérarchisation réelle et renforcée de vos animaux au sein de votre élevage, vous permettant de détecter les meilleurs.